

Vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA)

¿Qué es la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA)?

La FHA es una zoonosis viral aguda grave producida por el virus Junín, que tiene su reservorio en roedores silvestres. El área endémica de la enfermedad comprende la región de la pampa húmeda de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. La letalidad de la enfermedad sin tratamiento específico es de entre 15% y un 30%, y se reduce al 1% cuando se aplica el tratamiento específico dentro de la primera semana del inicio de los síntomas. La enfermedad tiene una duración de una a dos semanas y presenta cuadros clínicos de gravedad variable, preferentemente neurológicos, hemorrágicos o mixtos.

El comienzo de la enfermedad es insidioso e inespecífico, con decaimiento, cefalea e hipertermia moderada. Con el avance de la enfermedad se agregan mialgias, lumbalgias, artralgias, dolor retroocular, epigastralgia, mareos, náuseas y vómitos. En caso de haber hemorragias, estas se limitan a epistaxis o gingivorragias leves. Es prácticamente constante la ausencia de tos productiva o congestión nasal.

Usualmente no existe transmisión del virus de persona a persona, a pesar de que en casos de contacto íntimo esta transmisión puede ocurrir.

Indicaciones y edad

La vacunación contra la FHA está indicada a partir de los 15 años de edad en el área endémica de la enfermedad de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. La vacunación debe realizarse por lo menos un mes antes de que se realicen actividades de riesgo, a fin de asegurar la protección.

Esquema y vía de administración

Se aplica en una dosis única de 0,5 ml de producto reconstituido, por vía intramuscular, utilizando jeringas descartables de 1 ml y agujas 22G x 1.

Efectos secundarios

La tolerancia a la vacuna es muy buena. Los efectos que se han reportado han sido leves, de duración limitada y de resolución espontánea o con tratamiento sintomático. Los efectos secundarios incluyen la presentación dentro de las tres semanas posteriores a la vacunación de: cefalea, decaimiento, mialgias, fiebre, náuseas y/o vómitos, dolor retro-ocular, mareos, lumbalgia, exantema, reacciones locales, picazón, eritema y leve induración.